

## Invalidita a miera funkčnej poruchy podľa diagnóz

### Karcinóm prsníka

#### **Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch prsníka:**

Po odstránení v štádiu I (T1 N0 M0) alebo po parciálnej resekcii	30 – 40 %
Po odstránení v štádiu II (T2 N1 M0)	50 – 70 %
Po odstránení v pokročilých štádiách - po odstránení prsníka s exenteráciou axily, počas onkologickej liečby	75 – 80 %
Neliečiteľné formy	90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)	30 – 50 %

Pri posudzovaní sa má prihliadať aj na obmedzenie funkcie v ramennom kĺbe (napr. lymfedém, defekty svalov). Pokiaľ pacientka trpí aj ďalšími ochoreniami, percento invalidity možno zvýšiť o maximálne 10 % za všetky ochorenia spolu. Musí však ísť o ochorenia, ktoré nie sú iba prechodné a zasahujú do schopnosti pracovať.

#### **Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch prsníka:**

Po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOM0)	50 %
Po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80 – 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie)	40 – 50 %
Recidívy	70 – 80 %
Neliečiteľné formy	90 – 100 %

### Karcinóm hrubého čreva a konečníka

#### **Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch čreva a konečníka:**

Po odstránení lokalizovaných črevných nádorov, časti hrubého čreva alebo rekta	50 – 60 %
S vytvorenou kolostómiou, počas onkologickej liečby	70 – 80 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)	50 %
S ukončenou liečbou s trvalou kolostómiou	50 – 70 %
Neliečiteľné formy	90 %

#### **Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch čreva a konečníka:**

Po odstránení lokalizovaných črevných nádorov z oblasti tračníka alebo rekta vo včasnom štádiu (T1 – NOMO Dukes A) počas onkologickej liečby	60 %
S vytvorením trvalej kolostómie	80 %

Počas onkologickej liečby bez vytvorenia kolostómie	60 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (po piatich rokov od stabilizácie)	40 - 50 %
Recidívy	70 - 80 %
Neliečiteľné formy	90 – 100 %

### **Karcinóm pečene**

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch pečene:**

Počas onkologickej liečby	70 - 80 %
Neliečiteľné formy	90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)	30 – 50 %

**Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch pečene:**

Počas onkologickej liečby	90 - 100 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (po piatich rokov od stabilizácie)	40 - 50 %
Recidívy	70 - 80 %
Neliečiteľné formy	90 – 100 %

### **Karcinóm obličky**

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch obličky:**

Počas onkologickej liečby	70 - 80 %
Po dosiahnutí stabilizácie zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)	30 - 50 %
Neliečiteľné formy	90 %

**Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky:**

Po odstránení vo včasnom štádiu (T1 N0M0), bez komplikácií	40 %
Po odstránení vo včasnom štádiu (T1 N0M0), s komplikáciami	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)	40 – 50 %
Neliečiteľné formy	90 - 100 %
Recidívy	70 – 80 %

### **Karcinóm pankreasu**

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch podžalúdkovej žľazy:**

Počas onkologickej liečby	70 - 80 %
---------------------------	-----------

Neliečiteľné formy	90 %
Po dosiahnutí stabilizácie (spravidla po dvoch rokoch)	40 - 50 %

**Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch podžalúdkovej žľazy:**

Počas onkologickej liečby	90 - 100 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)	40 - 50 %
Recidívy	70 - 80 %
Nevyliečiteľné formy	90 - 100 %

**Karcinóm žalúdka**

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch žalúdka:**

Čiastočné odstránenie žalúdka v rannom štádiu (early cancer T1 N0 M0)	50 %
Po resekcii žalúdka počas onkologickej liečby	70 – 80 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)	40 – 60 %

**Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch žalúdka:**

Pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer – T1 – NOMO)	50 %
Po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcom onkologickom liečení	80 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (po piatich rokoch od stabilizácie)	40 - 50 %
Recidívy	70 - 80 %
Neliečiteľné formy	90 – 100 %

**Karcinóm prostaty**

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch prostaty:**

Po odstránení vo včasnom štádiu (T1 - 2 N0 M0)	30 – 40 %
Počas uroonkologickej liečby pokročilého štádia	70 – 80 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)	30 – 50 %
Neliečiteľné formy	90 %

**Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch prostaty:**

Po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO), ak je prítomná erekčívna dysfunkcia, alebo inkontinencia moču ako následok liečby	40 - 50 %
Po odstránení alebo neodstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80 - 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie)	40 - 50 %

Neliečiteľné formy	90 - 100 %
Recidívy	70 - 80 %

### **Malígnny melanóm**

#### **Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch kože:**

Po odstránení melanómu v štádiu Ia (T1 N0 M0)	20 – 30 %
Po odstránení zhubných nádorov v štádiách T1-2 N0-2 M0	50 – 60 %
Po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby	70 – 80 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)	30 – 50 %
Neliečiteľné formy	90 %

#### **Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch kože:**

Po odstránení v počiatočnom štádiu	40 %
V pokročilom štádiu alebo neliečiteľné formy	80 – 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie)	40 – 50 %
Recidívy	70 – 80 %

### **Nádor na mozgu**

#### **Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch mozgu:**

Po odstránení nádoru počas onkologickej liečby	70 - 75 %
Neliečené formy so stredne ťažkým až ťažkým poškodením mozgu	90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu, s ľahkým reziduálnym neurologickým nálezom (spravidla po dvoch rokoch)	50 – 70 %

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v rámci jednotlivých rozpätí sa určí podľa neurologického, psychiatrického a psychologického nálezu, prípadne zmyslových porúch, s ohľadom na možnosti operačného zákroku a výsledku onkologickej liečby.

#### **Miera funkčnej poruchy pri nádoroch mozgu:**

Stavy po operácii, stavy počas onkologickej liečby	50 – 60 %
Po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii s minimálnym až miernym reziduálnym nálezom (päť rokov od stabilizácie)	40 %
Neliečiteľné formy so stredne ťažkým postihnutím	60 - 80 %
Neliečiteľné formy s ťažkým postihnutím	90 - 100 %

## Karcinóm pľúc

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri nádoroch dýchacích ciest, pľúc a medzi pľúcia (mediastina):**

Po úplnom odstránení nádoru (ľubovoľnou liečbou), bez obmedzenia pľúcnych funkcií	10 – 15 %
Po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ľahkého stupňa	20 – 30 %
Po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií stredne ťažkého stupňa	35 – 50 %
Po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ťažkého stupňa	55 – 80 %
Počas onkologickej liečby	70 - 80 %
Nevyliečiteľná choroba	90 %

**Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch bronchiálnych a pľúcnych:**

Počas chemoterapie, aktinoterapie, chirurgickej liečby	80 %
Neliečiteľné formy	100 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie) s ľahkým obmedzením pľúcnych funkcií	40 %
Obmedzenie pľúcnej funkcie stredného až ťažkého stupňa	60 - 80 %
Recidívy	70 - 80 %

## Karcinóm maternice

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch maternice:**

Po odstránení nádoru tela alebo krčka maternice vo FIGO štádiu Ia a Ib (T1 NX M0)	30 – 40 %
Po odstránení nádoru vo FIGO štádiu II (T2 NX M0)	50 – 70 %
Po odstránení nádoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	75 – 80 %
Neliečiteľné formy	90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)	30 – 50 %

**Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch maternice:**

Po odstránení tumoru krčka maternice alebo tela maternice v štádiu Ia, Ib (T1 NOMO)	40 - 50 %
Po odstránení tumoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80 – 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie)	50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie)	40 – 50 %
Neliečiteľné formy	90 – 100 %
Recidívy	70 – 80 %

## **Akútna leukémia**

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri akútnej leukémii (lymfatickej, myeloidnej):**

Aktívne prejavy ochorenia	70 – 80 %
V štádiu remisie, po dvojročnej stabilizácii zdravotného stavu, pri stabilnom klinickom a laboratórnom náleze, so zníženou výkonnosťou organizmu	60 – 80 %

**Miera funkčnej poruchy pri akútnej leukémii:**

U dospelých	90 - 100 %
U detí až do skončenia liečby	100 %
Pri remisii trvajúcej päť rokov	30 - 40 %

## **Chronická leukémia**

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri chronickej leukémii (lymfatickej, myeloidnej):**

S miernymi prejavmi, v remisii, bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známkov progresie	10 – 20 %
So stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi s potrebou opakovanej hematologickej liečby, so zníženou výkonnosťou organizmu	30 – 50 %
Veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita, výrazne znížená výkonnosť organizmu, v sústavnej hematologickej liečbe s opakovanými hospitalizáciami	60 – 70 %

**Miera funkčnej poruchy pri chronickej lymfatickej leukémii (CLL) a chronickej myeloidnej leukémii (CML):**

CLL s ľahkými prejavmi	10 – 20 %
CLL so stredne ťažkými prejavmi počas liečby	60 – 80 %
CLL so stredne ťažkými prejavmi tri roky po ukončení liečby	40 %
CLL s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopenia a pod.)	90 – 100 %
CML v chronickej fáze v liečbe, bez prejavov na celkový stav	30 – 40 %
CML v chronickej fáze v liečbe, s prejavmi na celkový stav	50 – 60 %
CML v akcelerovanej alebo blastickej fáze	70 – 80 %

## **Lymfóm**

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri indolentných non-Hodgkinových lymfómoch (lymfogranulóm), primárne lokalizovaných NHL a Hodgkinovom lymfóme:**

S ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne priaznivým nálezom, ľahké subjektívne ťažkosti	10 – 20 %
So stredne ťažkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne stacionárnym nálezom, s podstatným znížením výkonnosti organizmu	45 – 50 %
S ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly, aktívny proces, v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu	70 – 80 %

**Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri malígnych lymfómoch:**

Akútne stavy	70 – 80 %
V remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou organizmu	35 – 45 %
Pokročilé štádium s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu	80 %

**Miera funkčnej poruchy pri non – Hodgkinových lymfómoch (NHL) :**

NHL s ľahkými prejavmi	10 – 20 %
NHL so stredne ťažkými prejavmi počas liečby	60 – 80 %
NHL so stredne ťažkými prejavmi tri roky po ukončení liečby	40 %
NHL s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.)	90 – 100 %
Difúzny NHL u dospelých	90 – 100 %
Difúzny NHL u detí	100 %
Difúzny NHL pri remisii trvajúcej päť rokov	30 - 40 %

**Miera funkčnej poruchy pri Hodgkinovom lymfóme:**

Štádium I. – III. A (počas dlhodobej liečby až do jej ukončenia I)	60 %
Štádium III. B – IV do ukončenia liečby	70 – 80 %
Štádium III. B – IV v plnej remisii (po troch rokoch od plnej remisie)	50 %